

TOBAK^B

Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!

potravinářská pšenice

Přednosti odrůdy

- Absolutně bezkonkurenční výnos zrna
- Velmi dobrý zdravotní stav
- Mrazuvzdornost a zimovzdornost
- Mimořádná plasticita

Pěstování odrůdy

• POPIS ODRŮDY

Naprosto šokující odrůda, bourající hranici 10 tun zrna z hektaru. Neuvěřitelně rekordních výnosů zrna odrůda TOBAK dosahuje zejména díky kombinaci mimořádně pevného zdraví, plastičnosti a tolerance k půdně-klimatickým podmínkám. Výnos je postaven na spojení vyššího počtu klasů, vysokého počtu zrn v klase a střední HTZ. Vyšší odnožovací schopnost zaručuje výbornou autokompatibilitu v průběhu špatných seřových podmínek.

• OMEZENÍ ODRŮDY

Při velmi vysokém infekčním tlaku fusarií doporučujeme neopomenout ošetření klasu.

• DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY

TOBAK je vysoce intenzivní odrůda, proto je třeba pro dosažení pekařských parametrů „A“ neopomenout vhodné hnojení sírou a všemi ostatními makro i mikroprvky a zejména zvýšené kvalitativní hnojení dusíkem.



TOBAK B

Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!

potravinářská pšenice

Popis odrůdy	----	---	--	-	0	+	++	+++	++++
	---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní								
Vývoj									
Počáteční vývoj	rychlý, vitální / vyšší odnožovací schopnost								
Výška rostlin	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Metání	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Zrání	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Přezimování									
Zimovzdornost	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Mrazuvzdornost	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Odolnost k přisuškům	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Odolnost vůči pohléhání	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Výnos zrna									
Výnos zrna	rekordní výnosy zrna (až 120 % na kontroly v neošetřené variantě)								
Hustota porostu	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Počet zrn v klase	████	████	████	████	████	████	████	████	████
HTZ	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Pekařská kvalita									
Pádové číslo	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Obsah bílkovin	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Sedimentační test	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Vaznost mouky	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Objemová hmotnost	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Objem pečiva	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Odolnost k chorobám									
Běloklasost	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Padlí list	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Padlí klasu	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Braničnatky listu	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Braničnatky klasu	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Rez pšeničná	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Rez žlutá (plevová)	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Fusarium klasu	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Plíseň sněžná	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Slechtitel	W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany								

ÚKZÚZ Brno 2010 - 2012

TOBAK^B

Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!

potravinářská pšenice

Termín setí od první poloviny září do konce října

Výsevek

Rané setí 300 zrn / m²
 Optimální podmínky 350 - 400 zrn/m²
 Pozdní setí 400 - 420 zrn/m²

Hnojení dusíkem

Hnojení dusíkem TOBAK je vysoce intenzivní pšenice 160 – 200 kg/ha

Odnožování (včetně Nmin)	EC 21 – 28 (odnožování)	50 – 60 kg N/ha (20 %)
Sloupkování (počátek)	EC 29 – 31 (počátek sloupkování)	30 – 40 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (vývoj)	EC 32 – 35 (hlavní sloupkování)	30 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu)	EC 45 – 49 (plný praporec až praskání pochvy)	50 – 60 kg N/ha (30 %)

Hnojení sírou první nebo druhé produkční hnojení doporučujeme provést hnojivem obsahujícím síru v dávce 20 – 30 kg síry/ha

Potřeba růstových regulátorů

EC 28 (konec odnožování)	CCC 750g 1,5l/ha
EC 31 (začátek sloupkování)	0,3 + 0,4 l/ha Etheponu nebo čistý trinexapac-ethyl 0,3 l/ha nebo mepiquat-prohexadion 0,6 l v EC 32 – 35

Fungicidní ošetření

Fungicidní ošetření

Dle infekčního tlaku	EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav (zejména fusarie klasu)	EC 51 – 65 přípravek s účinností na fusaria klasu

TOBAK B

Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!

potravinářská pšenice

Vhodnost po obilovině	ano (+)
Vhodnost po kukuřici	ne (-)

ÚKZÚZ Brno 2010 - 2012